

PROMALIN®

Regulador de crecimiento.



Guía de aplicación para manzano y peral.



www.kenogard.es



KENOGARD
CULTIVAMOS LA INVESTIGACIÓN

PROMALIN®

Regulador de crecimiento.



¿Qué es PROMALIN®?

PROMALIN® es un fitoregulador del crecimiento con dos ingredientes.

1.- El primero es una mezcla de dos giberelinas naturales que se encuentran en las plantas.

La Giberelina 4 y la Giberelina 7..... 1,9%

2.-El segundo compuesto, también se encuentra en la naturaleza, clasificado como citokinina.

La 6 - Benziladenina..... 1,9%

La gran pureza de los ingredientes de **PROMALIN®** provienen de los altos estándares farmacéuticos de calidad, utilizados en la planta de fermentación de Valent BioSciences Corporation EEUU por más de 50 años.


¿Que se consigue con PROMALIN®?

- ➔ Regularidad de los frutos en forma, medida, color e índice de maduración: **facilita la cosecha.**
- ➔ Mejor firmeza y cuajado.
- ➔ Antirisseting y mejora de la piel.



PROMALIN® esta inscrito en el R.O.P.F. con el nº 18210.
Cultivos autorizados: Peral y Manzano.

Periodos de Aplicación Óptimos



MANZANO



Variedad color "rojas"

Grupo Delicious

<i>Momento de aplicación</i>	<i>Dosis de aplicación</i>
20% Flor abierta	0,05%
100% Flor abierta	0,075%

Grupo Gala

<i>Momento de aplicación</i>	<i>Dosis de aplicación</i>
5% Flor abierta	0,05%
60% Flor abierta	0,025%

Grupo Fuji

<i>Momento de aplicación</i>	<i>Dosis de aplicación</i>
50% Flor abierta	0,05%
100% Flor abierta	0,025%
7 días de plena floración	0,025%
14 días de plena floración	0,025%

Con esta aplicación se consigue un buen cuajado y un calibre adecuado a las exigencias.



PROMALIN®

Regulador de crecimiento.

Variedad color “amarillas”

Grupo Golden

<i>Momento de aplicación</i>	<i>Dosis de aplicación</i>
60% Flor abierta	0,04%
7 días después 1^{er} tratamiento	0,03%
14 días después 1^{er} tratamiento	0,025%
21 días después 1^{er} tratamiento	0,025%

Con esta aplicación se consigue una forma atractiva del fruto y un poderoso efecto antirruseting.

Ramificado de manzanos

- Utilizar **PROMALIN®** con árboles mayores de 1 año de injerto.
- Aplicar cuando tienen de 60 a 90cm de altura.
- Pulverizar la parte superior hasta punto de goteo.
- Usar una dosis de 25-50ml/l de caldo (2,5-5%).
- Época de aplicación junio-julio.



PERAL



Grupo Conferencia

<i>Momento de aplicación</i>	<i>Dosis de aplicación</i>	<i>Observaciones</i>
5% Flor abierta	0,025%	Adjuntar 1 past. Berelex (x1000l. de agua)
50% Flor abierta	0,025%	Adjuntar 0,5 past. Berelex (x1000l. de agua)

Grupo Blanquilla

<i>Momento de aplicación</i>	<i>Dosis de aplicación</i>	<i>Observaciones</i>
20% Flor abierta	0,025%	Adjuntar 3 past. Berelex (x1000l. de agua)
100% Flor abierta	0,025%	Adjuntar 2 past. Berelex (x1000l. de agua)

Grupo Comice

<i>Momento de aplicación</i>	<i>Dosis de aplicación</i>	<i>Observaciones</i>
80% Flor abierta	0,025%	Adjuntar 1 past. Berelex (x1000l. de agua)
7 días después de 1 ^{er} tratamiento	0,025%	Adjuntar 0,5 past. Berelex (x1000l. de agua)
14 días después de 1 ^{er} tratamiento	0,025%	Adjuntar 0,25 past. Berelex (x1000l. de agua)



PROMALIN®

Regulador de crecimiento.

Grupo Abatel Fetel

Momento de aplicación	Dosis de aplicación	Observaciones
25% Flor abierta	0,5%	Adjuntar 2 past. Berelex (x1000l. de agua)
75% Flor abierta	0,025%	

Con estas aplicaciones se consigue un excelente cuajado de la pera con una forma adecuada a las exigencias del mercado. También un potente efecto anti-helada.

Nota: PROMALIN® no tiene clasificación, frases de riesgo, símbolos ni pictogramas.

PROMALIN® y maxCel® cuentan con la calidad de fabricación en nuestra planta de EEUU de:



PROMALIN®

Regulador de crecimiento.



Notas



PROMALIN[®]

Ruled lines for writing, consisting of 18 horizontal lines.

PROMALIN®



KENOGARD

CULTIVAMOS LA INVESTIGACIÓN

KENOGARD, S.A.

Diputación, 279 - 08007 BARCELONA

Tel.934 881 270 - www.kenogard.es