

Información Técnica (Cítricos)

Usos: Ácaros y Moscas Blancas

Dosis:
150 ml/hl (*Panonychus* / *Eutetranychus*)
200 ml/hl (*Tetranychus* / Mosca blanca)
(máximo 3L/ha p.f.)

Nº de Aplicaciones: 1 aplicación por año

Grupo IRAC: 21-A (acaricidas METI)

LMR: 0,5 ppm (todos los cítricos)

Estadio de aplicación: Desde BBCH 69 (caída de pétalos) hasta BBCH 83 (fruto maduro para recolección, antes de la coloración característica)

Plazo de Seguridad: 14 días

Plazo de Reentrada: Se puede entrar en el cultivo tratado una vez ya seca la pulverización.

Principales Especies Plaga controladas con Poseidon®

Ácaros Tetránquidos	Ácaro rojo de los cítricos	<i>Panonychus citri</i> (McGregor)
	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i> (Koch)
	Ácaro rojo oriental	<i>Eutetranychus orientalis</i> (Klein)
	Ácaro de Texas	<i>Eutetranychus banksi</i> (McGregor)
Moscas Blancas	Mosca blanca algodonosa	<i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell)
	Mosca blanca de los cítricos	<i>Dialeurodes citri</i> (Ashmead)
	Mosca blanca japonesa	<i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana)
	Mosca blanca (Paraleyrodes)	<i>Paraleyrodes minei laccharino</i>



Composición: Piridaben 10% SC (p/v)

Inscrito en el R.O.P.F. con el número ES-00114

Presentación: Envases de 1 y 5 L

Diciembre 2018



Óptima decisión

Para el Control
de Ácaros y Mosca Blanca
en Cítricos



Distribuido por:

Insecticida-Acaricida para un control eficaz de ácaros y moscas blancas en cítricos



Poseidon® es un nuevo formulado insecticida-acaricida de contacto que proporciona un control eficaz de ácaros y moscas blancas en cítricos. Excelente acción sobre formas móviles (larvas, ninfas, adultos) de ácaros y moscas blancas.

Características:


Poseidon® está formulado como suspensión concentrada (SC), proporcionando una mayor comodidad de dosificación y manejo.

Actúa por contacto e ingestión, caracterizándose por su gran efecto de choque y persistencia.

Su eficacia no se ve condicionada por la temperatura ambiental.

Nueva formulación más eficaz

Eficacia en campo contra *Tetranychus urticae* (formas adultas)
Tomate; formas adultas; 1500 L/ha; 10SC: 14g a.i./hl; 20WP: 20g a.i./hl



Pyridaben 10 SC Pyridaben 20 WP

**LA FORMULACIÓN 10 SC
MEJORA LA EFICACIA Y LA PERSISTENCIA**



Estrategias de Aplicación

Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
				Poseidon®							

Aplicar **Poseidon®** a una dosis de 150 a 200 ml/hL, en el momento de aparición de la plaga.

Aplicaciones en Primavera-Verano (mayo-julio), enfocadas principalmente para control de araña roja (*Tetranychus*) y moscas blancas (*Parabemisia*, *Dialeurodes*).

Aplicaciones en Verano-Otoño (agosto-octubre), enfocadas principalmente para control de ácaro rojo (*Panonychus*), ácaro oriental o de Texas (*Eutetranychus*), y moscas blancas (*Dialeurodes*, *Aleurothrixus*).

Recomendaciones

- Aplicar a inicio de infestación.
- Se recomiendan las dosis altas (200 ml/hl) para control de *Tetranychus urticae* y Mosca blanca.
- Posibilidad de aplicación simultánea contra ácaros y moscas blancas.
- Debe realizarse una correcta pulverización y mojado, utilizando un volumen de caldo adecuado al desarrollo del cultivo.

- No aplicar más de una vez por campaña o ciclo de cultivo; para una correcta gestión de resistencias, no alternar con otros acaricidas del grupo METI.
- En caso de fuertes infestaciones y/o para aumentar la persistencia frente ácaros sensibles, es aconsejable la mezcla con un producto ovicida (**Borneo®**).