



LA NUEVA GENERACIÓN ANTIBOTRITIS PARA UNA PRODUCCIÓN DE ALTA CALIDAD



Prolectus®



Prolectus®

Prolectus® es un fungicida antibotritis a base de **Fenpirazamina**, una nueva molécula descubierta y desarrollada por Sumitomo Chemical.

Prolectus® es un producto de vanguardia: **se degrada rápidamente en suelo y agua, compatible con los principales insectos auxiliares, cuidadoso con el cultivo, seguro para las personas y con un perfil de residuos** que lo hace adecuado para cumplir con los requisitos de los mercados más exigentes.

Beneficios Prolectus®

- **Buena eficacia** tanto preventiva como curativa sobre infecciones activas de Botritis spp.
- Excelente acción **antiesporulante**.
- **Elevada flexibilidad de aplicación** para facilitar los trabajos cuando se dan condiciones para el desarrollo del hongo.
- **Rápida penetración en la planta**, con excelente movimiento translaminar, resistente al lavado por lluvia.
- Nivel de residuos bajo, con **sólo una materia activa**.
- Suave con el cultivo. **No produce frenado** de la planta
- Buena **compatibilidad con insectos auxiliares**.
- **Amplia ventana de aplicación** desde inicio del cultivo hasta recolección (fresa).

Composición:

Fenpirazamina 50% p/p (WG)

Inscrito en el R.O.P.F.: ES-00035

Presentación: Envase de 1 kg, 250 g, sobres 90 g




Uso: Botritis

Cultivo	Dosis	LMR EU	P.S
Fresal	0,80 - 1,2 kg/ha	3.0 ppm	1 día
Frutos de caña (frambuesa, mora, otras)*		5.0 ppm	N.P
Arándano*		4.0 ppm	N.P

*usos menores

- En fresal realizar hasta 3 aplicaciones por campaña, separadas un mínimo de 7 días y con un volumen de caldo entre 500-1200 l/ha. Dosis recomendada 1,2 kg/ha.
- En arándanos y frutos de caña aplicar en pulverización foliar antes de la plena floración (BBCH 65). Se puede realizar hasta un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7 días y un volumen de caldo de 500-1200 l/ha.
- Se recomienda realizar la aplicación nada más preparada la mezcla en tanque, asegurando un **pH neutro** del caldo. PHs ácidos favorecen una mayor degradación del producto, reduciendo su eficacia.
- Mantener el agitador en marcha durante la realización de la mezcla y aplicación. Introducir primero **Prolectus®** y esperar a que esté totalmente disuelto antes de añadir otros productos en el tanque.
- No mezclar con tebuconazol ni metildinocap.

Eficacia en Fresa - Valoración en el momento de cosecha



promedio 2 ensayos

incidencia en testigo: 20%

Distribuido por: