



Dosis Registrada
max. 200 g/ha real tratada
Caldo: 100-400 l/ha
PS: 75 días

Dosis Registrada
max. 200 g/ha real tratada
Caldo: 200-400 l/ha
PS: 45 días

Dosis Registrada
max. 200 g/ha real tratada
Caldo: 200-400 l/ha
PS: 45 días

Recomendaciones generales:

1. Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malas hierbas
2. Realizar 1 aplicación al año
3. Tratar en bandas en la fila del cultivo
4. No mojar más de 1/3 de la superficie del suelo
5. Lluvias posteriores a 2 horas de la aplicación no afectan su eficacia
6. Para una buena eficacia se precisa de tener humedad en el suelo.
7. No mojar las partes verdes de cultivo, tratando en cultivos bien establecidos, de más de 4 años.

Composición: Flazasulfuron 25% WG

Inscrito en R.O.P.F. con el número ES-00578

Presentación: Envase 200g

Distribuido por:



Marzo 2018

La estrella de los herbicidas





Herbicida para un control eficaz y duradero de las malas hierbas

Minsk® es un nuevo herbicida sistémico que proporciona un control eficaz y duradero de las malas hierbas.

Acción herbicida en pre-emergencia y en post-emergencia temprana (se absorbe rápidamente por las hojas), tanto en mono como en dicotiledóneas, anuales y perennes.

Especialmente recomendado para control de malas hierbas difíciles o resistentes a otros herbicidas, como Conyza, Lolium, Malva, Ortiga o Cyperus entre otras

Características:

Minsk® está formulado como gránulos dispersables (WG).

Los gránulos se formulan por extrusión, obteniendo **gránulos muy regulares y compactados**, sin presencia de polvo en el fondo del envase.

A la hora de realizar la mezcla en agua, el producto se mantiene en disolución completa sin formarse depósitos en el fondo

El producto incorpora un novedoso dosificador exclusivo:

1. Evita el contacto directo con el producto.
2. Asegura la dosificación correcta del mismo.

Estrategias de Aplicación

CÍTRICOS

Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
			Minsk®								

OLIVAR

Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
	Gulfstream®							Minsk®			
	Minsk®							Gulfstream®			

VID

Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
	Minsk®										

Aplicar **Minsk®** entre **100-150 g/ha real tratada** en post-emergencia temprana.

Se recomienda la mezcla con **Rotundo® Top 360 / Rotundo® Top** para un mejor control en post-emergencia y reducir el riesgo de resistencias.

Aplicaciones en Primavera → aplicaciones enfocadas principalmente para control de Conyza o Lolium. En el caso de Conyza, aplicar en estado de roseta.

Aplicaciones en Otoño → para un control general de malas hierbas previo a la recolección, se puede reducir la dosis de aplicación a **80-100g/ha real tratada**.



Producto de referencia



Minsk®



Conyza spp.



Lolium rigidum*



Malva sylvestris



Cyperus rotundus

*Fuente: A. Robledo