KENOGARD

CULTIVAMOS LA INVESTIGACION · 研究深耕

Gorden® Max

ABONO

Promueve el engorde y mejora el calibre de los frutos

ALTO CONTENIDO EN L-TRIPTOFANO 22,5%

www.kenogard.es

- **Inductor de la biosíntesis de auxinas**, estimulando la producción natural de ácido indolacético (AIA).
- **Favorece el engorde del fruto y mejora su calibre**, optimizando el desarrollo del cultivo.
- **Actúa como elicitor**, fortaleciendo las defensas de la planta, retrasando la senescencia y aumentando la resistencia al estrés abiótico.
- **Formulación vegetal sin residuos hormonales**, enriquecida con enriquecida con triptófano, glicina-betaína y potasio (K_2O) para potenciar el engorde y la tolerancia a condiciones adversas.

Composición

Aminoácidos libres; Triptófano (Trp) 22,5% p/p; Glicina-Betaína 9% p/p.

Aminoácidos producidos por fermentación de *Corynebacterium glutamicum*.

Óxido de potasio (K_2O) 4% p/p.

Nitrógeno Total (N) 4% p/p (Nitrógeno orgánico 4% p/p).

FAVORECE EL ENGORDE DEL FRUTO, AUMENTA SU CALIBRE Y MEJORA LA RESISTENCIA AL CRACKING.

Dosis de aplicación radicular:

- **Hortícolas de fruto**: 0,5L/ha. Aumenta el calibre del fruto, la homogeneidad y mejora la resistencia al cracking. Aplicar durante el engorde comenzando tras el primer desarrollo y repetir el tratamiento cada 7-10 días.
- **Todos los cultivos**: 0,35-0,5L/ha. Aplicar durante la fase de engorde cada 7-10 días según cultivo.

Dosis de aplicación foliar:

- **Hortícolas de fruto**: 300-500 cm^3/1000L. Aumenta el calibre del fruto, la homogeneidad y mejora la resistencia al cracking. Aplicar durante el engorde comenzando tras el primer desarrollo y repetir el tratamiento cada 7-10 días.
- **Vid**: 350-500 cm^3/1000L. Mejora el desarrollo y lignificación de los haces vasculares resultando en un aumento en el tamaño y la calidad de las bayas. Aplicar en tamaño guisante y realizar otro tratamiento a los 7-10 días.
- **Frutales de hueso**: 350 cm^3/1000L. Mejora el calibre y la homogeneidad. Aplicar tras la caída del capuchón y repetir tratamiento a los 7-10 días.
- **Frutales de Pepita**: 350 cm^3/1000L. Mejora la resistencia al cracking, el calibre y la calidad del fruto. Aplicar 15 días después de la floración.
- **Cerezo**: 250-350 cm3/1000L. Mejora la resistencia al cracking. Aplicar tras el cambio de color y repetir el tratamiento a los 7-10 días según climatología.
- **Cítricos**: 350 cm^3/1000L. Mejora el calibre y la homogeneidad. Aplicar tras la caída natural de los frutos. Si la variedad lo requiere se puede repetir la aplicación durante el verano.

Kenogard, S.A.
Diputación 279, 5º. 08007 Barcelona
Tel. 934 881 270 - www.kenogard.es

Febrero-2025